


**Ime in priimek:** Blatnik Tomaž  
**Podpis:** blatnikto  
**Datum:** 20.10.2010

**Author (SRJ)**  
**Approver1 (SRJ)**  
 Janc Dejan  
 jancd  
 22.10.2010

**Approver2 (SRJ)**  
 Lenič Jožica  
 lenic  
 26.10.2010

**Ecocid S praš DE 1. stran**



# Ecocid<sup>®</sup> S

## Desinfektionsmittel

Wasserlösliches Pulver (SP) zur Desinfektion

- ▶ Biozid-Produkt für die Hygiene im Veterinärbereich
- ▶ Trinkwasserdesinfektionsmittel
- ▶ Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich

**Gebrauchsanweisungen**

Ecocid S ist ein vielseitig einsetzbares sehr wirkungsvolles Desinfektionsmittel zum sicheren und wirksamen Schutz vor allen bekannten Viren, Bakterien und Pilzen.

Dank hoher Sicherheit und breitem biozidem Wirkungsspektrum kann es für verschiedene Zwecke eingesetzt werden: **tiermedizinische Einrichtungen (Tierarztpraxen, Tierkliniken und Labore):** es wird zur Desinfektion aller Flächen eingesetzt, wo es nötig ist, sicher und wirksam alle Viren, grampositive und gramnegative Bakterien und Pilze abzutöten. Das Gleiche gilt für Einrichtungen, Behältnisse, Gegenstände aus Glas, Instrumente usw.



**Stallgebäude und Stalleinrichtung:** Mit Ecocid S werden alle Flächen und Einrichtungen in Räumen zur Futterzubereitung, in Stallungen, Zwingern, Kaninchenställen, Käfigen, Bienenstöcken und anderen Räumlichkeiten zur Belegung von Tieren desinfiziert.

**Andere Anwendungsgebiete:** Ecocid S kommt zum Einsatz bei Desinfektion von Transportfahrzeugen, Schlachthöfen, Flächen und Räumen auf Viehmärkten, Räumlichkeiten zur Lebensmittelherstellung und -lagerung und bei der Desinfektion von Ausrüstung und Flächen im Haushalt.



Die Gebrauchslösung Ecocid S wird verwendet zum Sprühen, als Nebel, Klauenbad oder Schleusen. **Zur allgemeinen Desinfektion von vorher gereinigten Flächen und Ausrüstung wird 1-prozentige Ecocid S - Lösung zubereitet.** Den Sackinhalt zu 50 g in 5 l Wasser auflösen. Zur schnelleren Auflösung wird lauwarmes Wasser empfohlen. Wird eine größere Menge der Desinfektionslösung gebraucht, den Sackinhalt zu 1 kg verwenden und in 100 l Wasser auflösen.

Anwendungszweck	Konzentration	Ausbringung
<b>Schlußdesinfektion</b>	1 : 100 (1 %)	Gebrauchslösung auf vorher gereinigte Flächen mit einem Niederdruckgerät zum Sprühen oder einer anderen mechanischen Spritze in der Dosierung 300 - 400 ml/m <sup>2</sup> ausbringen. Nach 30 bis 120 Minuten, bzw. wenn die Flächen wieder trocken sind, erfolgt die Neubelegung.
<b>Reinigung und Desinfektion der Einrichtung</b> auf Farmen, in Brütereien, in Betrieben zur Futterzubereitung	1 : 200 - 1 : 33 (0,5 % bis 3 %) je nach Verschmutzungsgrad	Die Einrichtung reinigen und mit der Gebrauchslösung, die mit einem Niederdruckgerät zur Desinfektion oder einer anderen mechanischen Spritze in der Dosierung 300 - 400 ml/m <sup>2</sup> ausgebracht wird, desinfizieren. Nach 30 bis 120 Minuten, je nach Verschmutzungsgrad, mit klarem Wasser ausspülen.
<b>Desinfektion von Trinkwasserleitungssystemen</b> Schlußreinigung und -desinfektion	1 : 200 (0,5 %)	Den Wasserbehälter und das Tränkesystem mit Gebrauchslösung auffüllen. Nach 60 Minuten das System gründlich mit klarem Wasser spülen.
Ununterbrochene Desinfektion des Tränkewassers	1 : 1000 (0,1 %)	In den Wasserbehälter geeignete Menge von Ecocid S einmischen oder geeignete Menge der Gebrauchslösung zubereiten und sie in die automatische Dosiereinrichtung füllen.
<b>Desinfektionschleusen für Fahrzeuge und Schuhwerk sowie Klauenbad</b>	1 : 100 (1 %)	Schleuse und Klauenbad werden 4 Tage lang, bzw. solange sie nicht zu stark verschmutzt sind, angewendet.



**Ecocid S praš DE 2. stran**

<b>Luftdesinfektion</b> Sprühen in die Luft zur Verminderung von Kreuzinfektionen bei Ausbruch der Krankheiten (insbesondere bei Krankheiten der Atmungsorgane)	1 : 200 (0,5 %)	Mit einem Druckgerät, das sehr feine Vernebelung ermöglicht, oder der Rücktragespritze in der Dosierung 1 l/10 m <sup>2</sup> Bodenfläche desinfizieren.
Kaltvernebelung	1 : 100 (1 %)	Mit dem Kaltnebelgerät den leeren Raum (Stallung) in der Dosierung 1 l/10 m <sup>2</sup> Bodenfläche vernebeln und 30 Minuten einwirken lassen. Vor Neubelegung Raum 30 bis 60 Minuten lüften.
Heißvernebelung	1 : 25 (4 %)	Zunächst Lösung des Nebelmittels im Verhältnis 15 : 85 zugunsten des Wassers zubereiten. In die so zubereitete Lösung Ecocid S zugeben. Mit dem Heißnebelgerät den Raum (Stallung) in der Dosierung 1 l/40 m <sup>2</sup> Bodenfläche vernebeln und 30 bis 60 Minuten einwirken lassen. Vor Neubelegung Raum 30 bis 60 Minuten lüften.

**Nebenwirkungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Falls es bei Einatmung zur Reizung der Atmungsorgane kommt, den Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Atemnot und Kurzatmigkeit, die den Betroffenen zusätzlich beunruhigen, oder bei anhaltenden Beschwerden, Arzt konsultieren.

Bei zufälligem Hautkontakt kann es zu Reizwirkung der Haut kommen. Die beschmutzte Kleidung von der betroffenen Stelle entfernen und die Haut mit reichlich Wasser abspülen. Bei nach dem Abspülen andauernder Reizung Arzt hinzuziehen.

Bei Augenkontakt kann es zu Schädigungen kommen. Dann Augen gründlich mit reichlich Wasser oder physiologischer Augenausspüllösung bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten lang spülen und Arzt konsultieren.

Bei zufälligem Verschlucken kann es zu Schäden der Verdauungsorgane kommen. Dann kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit reichlich Wasser ausspülen. Ist der Betroffene bei Bewußtsein, viel Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Handhabung von Produktresten und der Verpackung als Abfall**

Mit Restmengen und Verpackung des Produktes ist gemäß Vorschriften über die Handhabung von Abfällen umzugehen.

**Vorsichtsmaßnahmen und weitere Angaben**

Bei der Anwendung des Produktes Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Gummihandschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild tragen.

Das Produkt in dicht verschlossener Originalverpackung, geschützt vor Feuchtigkeit, getrennt von brennbaren Stoffen, bei Temperaturen unter 30 °C und für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Es wird empfohlen, die angebrochene Packung von Ecocid S ganz zu verwenden.

Beim Desinfektionsverfahren angewandte Geräte (Spritzen, Sprühgeräte, Vernebler) nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen.

Zum Allgemeingebrauch, für berufsmäßige Verwender und gewerbliche Verbraucher.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Biozid - Produkt Registriernummer: N-30524, N-30523, N-30520, N-30519




Diese Anwendungsempfehlungen basieren auf Europäischen EN-Wirksamkeitsprüfungen, anstelle der DVG-Liste.



- Barvni prehod (PMS-376U-KRKA (100%) - ČrnaU (100%))
- PMS-234U-KRKA
- PMS-376U-KRKA
- ČrnaU

<b>KRKA</b>
Šifra: 243070
Emb. mat.: NA. ECOCID S praš DE
Dimenzije: 148 ± 0,5 mm x 210 ± 0,5mm
Material: papir tip B
PhC št.: 382
Merilo: 1:1
Datum: 20.10.2010
Izdelač: T. Blatnik
Pregledal: N. Regina
Odobril: Oddelek za registracijsko označevanje izdelkov
<b>Oddelek za oblikovanje</b>



243070 B-8881